ECOCARDIOGRAFIA 2015
XVII CONGRESSO NAZIONALE SIEC
NAPOLI 16-18 APRILE 2015

Società Italiana di Ecografia Cardiovascolare

WWW.SIEC.IT

ECOCARDIOGRAFIA 2015
XVII Congresso Nazionale SIEC
Hotel Royal Continental
Napoli, 16-18 Aprile 2015

COME METTO LA SONDA?
L'ESSENZIALE PER INIZIARE
L'ECO VASCOLARE

TRONCHI SOVRAAORTICI

Antonio Tota MD
Cardiologia Ospedaliera
Policlinico Bari

STUDIO DEL DISTRETTO CAROTIDEO

DISTRETTI ESPLORATI:

- Carotide Comune (CC)
- Carotide Interna (CI)
- Carotide Esterna (CE)
- Arterie Vertebrali
- Arterie Succlavie

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL' ESAME ECOCOLOR DOPPLER

- Paziente supino
- Proiezioni anteriore, laterale e posteriore
- Scansioni trasversale e longitudinale prima in B-mode successivamente con mappa colore di tutto l'asse
- Studio del segnale Doppler

IL PAZIENTE E L'OPERATORE

- Operatore posizionato dietro la testa
- Decubito supino
- Capo iperesteso
- Rotazione controlaterale del capo

LA SCELTA DEL TRASDUTTORE

SONDE LINEARI

SONDE CONVEX

STUDIO DEL DISTRETTO CAROTIDEO

- Sonda posizionata lungo il ventre mediale m. sterno-cleido
- Decorso anatomico della carotide dalla clavicola fino alla biforcazione
- Repere: vena giugulare interna

CAROTIDE COMUNE

STUDIO DEL DISTRETTO CAROTIDEO

- Accesso anteriore con inclinazione della sonda di 45-60°
- Accesso posteriore con inclinazione della sonda di 10-30°
- Repere: bulbo carotideo

CAROTIDE INTERNA

STUDIO DEL DISTRETTO CAROTIDEO

- Accesso anteriore con inclinazione della sonda di 10-45
- Repere: bulbo carotideo

CAROTIDE ESTERNA

STUDIO DEL DISTRETTO CAROTIDEO

- Posizione del capo ruotato di 0°
- Repere: carotide comune; corpi vertebrali (iperecogeni) e spazio intervertebrale (ipoecogeno)

ARTERIA VERTEBRALE

STUDIO DEL DISTRETTO CAROTIDEO

- Sonda posizionata parallela alla clavicola
- Repere: vena giugulare interna e/o carotide comune

SUCCLAVIA

VALUTAZIONE MORFOLOGICA

CAROTIDE COMUNE

BIFORCAZIONE

**CAROTIDE ESTERNA
CAROTIDE INTERNA**

STUDIO DELLA PARETE VASALE

ECOGRAFIA CAROTIDEA

INTIMA - MEDIA

Common Carotid Artery

Blood/Intima

Intima Media
Thickness

Media/Adventitia

SPESSORE MEDIO-INTIMALE

- È la distanza tra l'interfaccia lume-intima e l'interfaccia media-avventizia. Si valuta a livello della parete posteriore (lontana) dell'arteria carotide comune 2 cm sotto la biforcazione effettuando 3 misure a destra e 3 misure a sinistra, valori normali compresi tra 0.6-0.9 mm

DANNO D'ORGANO SUBCLINICO

IMT carotideo markers di elevato rischio cardiovascolare

IMT

NORMALE

IMT
↓
↑
< 0,9

↑ SPESSORE

IMT
↓
↑
0,9-1,5

PLACCA

IMT
↓
↑
>1,5

Intima Media Thickness

VALUTAZIONE FUNZIONALE

CAROTIDE COMUNE

CAROTIDE ESTERNA

CAROTIDE INTERNA

ESAME COLOR DOPPLER

DOPPLER

DOPPLER

CAROTIDE COMUNE

CAROTIDE INTERNA

CAROTIDE ESTERNA

CURVA SPETTRALE MONOFASICA

CURVA SPETTRALE TRIFASICA

LA PLACCA ATEROSCLEROTICA

È definita come formazione parietale localizzata, di varia ecogenicità, con spessore $> 1.3-1.5$ mm, che modifica la linearità del profilo interno del vaso

PLACCA

LA PLACCA ATEROSCLEROTICA

La valutazione della placca aterosclerotica tiene conto dei seguenti parametri:

1. **caratteristiche geometriche**
2. **grado di stenosi**
3. **analisi eco-strutturale**
4. **omogenicità**
5. **profilo di superficie**

1. Caratteristiche geometriche

La descrizione della placca richiede un'analisi delle caratteristiche geometriche, quali:

- sede: più frequentemente le lesioni aterosclerotiche sono localizzate a livello della biforcazione carotidea e nel tratto prossimale della carotide interna ed esterna
- estensione longitudinale: focale o tubulare
- concentricità o eccentricità

STENOSI CAROTIDEA

Distribution of atherosclerotic occlusive lesions in patients presenting with neurologic symptoms

2. Grado di stenosi

Un'analisi planimetrica: rapporto tra lume residuo e lume totale in sezione longitudinale e trasversale, precisando che risulterà maggiore in sezione trasversale che in longitudinale

2. Grado di stenosi

- **Analisi flussimetrica** con Doppler pulsato nella sede della stenosi
- Valutazione della **turbolenza** del flusso nella sede della stenosi. Si presenta con il riempimento dell' area sottesa dal tracciato Doppler, e viene denominato “spectral broadening”, visibile nella figura 2, ma non nella 1

Tracciato di flusso Doppler della carotide comune normale (Fig. 1) e con stenosi significativa (Fig. 2)

EFFETTI EMODINAMICI A MONTE ED A VALLE DI UNA STENO-OSTRUZIONE ARTERIOSA

EFFETTI EMODINAMICI DI UNA STENOSI

Stenosi regolare <math>< 50\%</math>

EFFETTI EMODINAMICI A MONTE ED A VALLE DI UNA STENO-OSTRUZIONE ARTERIOSA

Stenosi regolare $50 > \leq 90\%$

EFFETTI EMODINAMICI A MONTE ED A VALLE DI UNA STENO-OSTRUZIONE ARTERIOSA

Stenosi regolare >90%

2. Grado di stenosi-Doppler

Grado di stenosi	Caratteristiche emodinamiche
STENOSI MINORE 0 - 30 % 30- 60 %	<ul style="list-style-type: none"> - nessun dato velocimetrico - aumento modesto della velocità sistolica (<125 cm/s') - riduzione modesta della finestra diastolica - Ratio Vs CI/CC < 1,8 ; Ratio VD CI/CC < 2,4
STENOSI MODERATA (60-80 %)	<ul style="list-style-type: none"> - aumento velocità sistolica (> 125 cm/sec) - aumento velocità diastolica (tra 40 e 100 cm/sec) - riduzione spiccata della finestra sistolica - Ratio VS CI/CC > 1,8 ; Ratio VD CI/CC > 2,2
STENOSI SEVERA (81-95%)	<ul style="list-style-type: none"> - aumento notevole della velocità sistolica (> 250 cm/s'') - aumento notevole della velocità diastolica (>100 cm/s'') - scomparsa della finestra sistolica - Ratio VS CI/CC > 3,7 ; Ratio VD CI/CC > 5,5
STENOSI PREOCCLUSIVA (> 95 %)	<ul style="list-style-type: none"> - Riduzione della velocità sistolica (flusso lento) - riduzione della escursione sistodiastolica (<i>aspetto a campana</i>)
OCCLUSIONE	<ul style="list-style-type: none"> - assenza di flusso - azzeramento della velocità diastolica nel tratto a monte (<i>aspetto frenato</i>)

3. Ecogenicità

Placca ipoecogena (lipidico/emorragica).

Placca soft, ipoecogena

3. Ecogenicità

Placca calcifica, iperecogena,

CC: placca calcifica e cono d'ombra posteriore

4. Omogenicità

In base alla combinazione delle sue componenti si distinguono inoltre:

Placche omogenee: con una regolare distribuzione dei tessuti, moderatamente o molto ecogene, es. fibrosa, fibrolipidica, fibrocalcifica

Placca iperecogena, fibrotica

4. Omogenicità

- Placche disomogenee: presentano ecogenicità mista con zone iperecogene, frammiste a zone moderatamente poco ecogene o ecoprive, queste ultime presenti per più del 20%. In genere si tratta di accumuli lipidici, o placche complicate (emorragiche, ulcerate), più frequenti a livello del bulbo

Placca disomogenea ulcerata

5. Profilo di superficie

Profilo regolare

Profilo irregolare

5. Profilo di superficie

Placca ulcerata della carotide comune

**Placca irregolare, ulcerata
biforcazione carotidea destra**

La Fenestrella

« Quanno spónta 'a luna a Marechiaro, pure li pisce nce fanno a ll'ammore... » (IT)

(Salvatore di Giacomo, *Marechiaro*^[1])

ECOCARDIOGRAFIA 2015
XVII CONGRESSO NAZIONALE SIEC
NAPOLI 16-18 APRILE 2015

Società Italiana di Ecografia Cardiovascolare

WWW.SIEC.IT

COME METTO LA SONDA?
L'ESSENZIALE PER INIZIARE
L'ECO VASCOLARE

TRONCHI SOVRAAORTICI

Antonio Tota MD
Cardiologia Ospedaliera
Policlinico Bari

ECOCARDIOGRAFIA 2015
XVII Congresso Nazionale SIEC
Hotel Royal Continental
Napoli, 16-18 Aprile 2015

ECOGRAFIA CAROTIDEA

INTIMA - MEDIA

Common Carotid Artery

Blood/Intima

Intima Media
Thickness

Media/Adventitia

IMT ED EVENTI CARDIOVASCOLARI

Table 1. Risk of MI, Stroke, and CVD Associated With CIMT Measured in the CCA in Main Prospective Studies in the General Population

Study	Event Follow-Up, y	Sex/Age, y	CCA Measure	Absolute Risk, %/y (Positive Test Result for CIMT)	Relative Risk (95% CI) [Hazard Ratio for CIMT]
KIHD ²	1.0 (MI)	M/42–60	Maximum	2.2 (>1mm)	2.2 (0.7–6.7) [CIMT ≥1 vs <1 mm]*
ROT ³	2.7 (MI)	M/F/≥55	Mean	0.7 (>0.91 mm and 80th percentile)	1.4 (1.2–1.8) [per 0.16-mm CIMT, 1 SD]†
CHS ⁴	6.2 (MI)	M/F/≥65	Maximum	1.6 (>1.18 mm and 5th quintile)	3.2 (2.0–5.1) [5th vs 1st CIMT quintile]†
MDCS ⁵	7.0 (MI)	M/F/46–68	Mean	NA	2.1 (1.2–3.4) [3rd vs 1st CIMT tertile]†
CAPS ⁶	4.2 (MI)	M/F/19–90	Mean	2.1 (>0.79 mm and 4 th quartile)	2.2 (1.9–4.0) [4th vs 1st CIMT quartile]†
ROT ³	2.7 (stroke)	M/F/≥55	Mean	0.8 (>0.91 mm and 80 th percentile)	1.4 (1.3–1.8) [per 0.16-mm CIMT, 1 SD]
CHS ⁴	6.2 (stroke)	M/F/≥65	Maximum	1.8 (>1.18 mm and 5 th quintile)	2.8 (1.8–4.2) [5th vs 1st CIMT quintile]†
CAPS ⁶	4.2 (stroke)	M/F/19–90	Mean	1.1 (>0.79 mm and 4th quartile)	2.3 (0.9–6.3) [4th vs 1st CIMT quartile]†
MDCS ⁷	7.0 (stroke)	M/F/46–68	Mean	0.4 (>0.81mm)	3.0 (1.6–5.7) [3rd vs 1st CIMT tertile]†
Kitamura et al ⁸	4.5 (stroke)	M/60–74	Maximum	1.3 (>1.07mm and 4th quartile)	3.5 (1.3–9.5) [4 th vs.1st CIMT quartile]
MESA ⁹	5.3 (CVD)	M/F/45–84	Maximum	1.8 (>0.97mm and 4th quartile)	2.3 (1.4–3.8) [4th vs 1st CIMT quartile]‡
CAPS ⁶	4.2 (CVD)	M/F/19–90	Mean	3.2 (>0.79 mm and 4 th quartile)	2.3 (1.4–3.8) [4th vs 1st CIMT quartile]†

CAPS indicates Carotid Atherosclerosis Progression Study; CCA, common carotid artery; CHS, Cardiovascular Health Study; CI, confidence interval; CIMT, carotid intima-media thickness; CVD, cardiovascular disease; KIHD, Kuopio Ischemic Heart Disease study; MDCS, Malmo Diet and Cancer Study; MESA, Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis; MI, myocardial infarction; NA, not available; ROT, Rotterdam Study.